

# CORZYNA<sup>MC</sup>

Ranolazine 500 mg et 1 000 mg

Comprimés à libération prolongée

## DÉPLIANT D'INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS (téléchargez des copies supplémentaires sur le site [www.kyepharma.com](http://www.kyepharma.com))

Consultez également la fiche  
d'information complète du patient  
disponible sur le site  
[www.kyepharma.com](http://www.kyepharma.com).

### ALERTE AU PATIENT

Des renseignements importants relatifs à la sécurité que vous devez connaître avant et pendant votre traitement par CORZYNA<sup>MC</sup> sont fournis ci-dessous (voir également dans ce dépliant la section « Avant de prendre CORZYNA<sup>MC</sup> »).

- CORZYNA<sup>MC</sup> peut provoquer un **allongement de l'intervalle QT** (changements dans l'activité électrique de votre cœur). Exemples de symptômes : étourdissements, sentiment de faiblesse ou de légèreté, battements de cœur irréguliers ou rapides, ou convulsions. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, cessez de prendre CORZYNA<sup>MC</sup> et consultez immédiatement votre médecin.
- Si vous présentez des **problèmes rénaux graves**, ne prenez PAS CORZYNA<sup>MC</sup>. CORZYNA<sup>MC</sup> peut aggraver votre maladie et causer une insuffisance rénale. Les symptômes peuvent comprendre : douleur, difficultés respiratoires, fatigue, confusion, nausées, gonflement des chevilles ou des pieds, douleur ou pression thoracique, ou faiblesse. Consultez votre médecin si vous ressentez l'un de ces symptômes ou rendez-vous aux services d'urgence les plus proches si les symptômes sont graves.
- CORZYNA<sup>MC</sup> **peut interagir avec certains médicaments** que vous prenez. Informez votre médecin de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels et médicaments non conventionnels. Assurez-vous de lire la section « Avant de prendre CORZYNA<sup>MC</sup> » de ce dépliant et de connaître les médicaments que vous ne devriez pas prendre avec CORZYNA<sup>MC</sup>.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

CORZYNA<sup>MC</sup> peut modifier l'activité électrique (allongement de l'intervalle QT) de votre cœur. Vous ne devez pas prendre plus de 1 000 mg de CORZYNA<sup>MC</sup> deux fois par jour.

### POUR QUOI CORZYNA<sup>MC</sup> EST-IL UTILISÉ?

CORZYNA<sup>MC</sup> est un médicament utilisé pour traiter les douleurs thoraciques (angine de poitrine stable) chez les adultes. Il est utilisé en concomitance avec d'autres médicaments chez les patients :

- qui ne peuvent tolérer d'autres traitements antiangineux ou pour lesquels d'autres traitements antiangineux ne permettent pas de contrôler leurs douleurs thoraciques, y compris les bêtabloquants et les inhibiteurs calciques.

### AVANT DE PRENDRE CORZYNA<sup>MC</sup>

Ne prenez pas CORZYNA<sup>MC</sup> dans les cas suivants :

- vous êtes allergique à la ranolazine ou à l'un des autres ingrédients de CORZYNA<sup>MC</sup>;
- vous êtes atteint d'une maladie rénale grave;
- vous êtes atteint d'une maladie hépatique modérée à grave;
- vous prenez les médicaments suivants, qui peuvent provoquer des interactions graves avec CORZYNA<sup>MC</sup>;
  - contre les arythmies : quinidine, procainamide, disopyramide, sotalol, ibutilide, amiodarone, dronedarone;
  - contre l'infection fongique : kétoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole;
  - contre l'infection : clarithromycine;
  - contre la dépression : néfazodone;
  - contre le VIH : nelfinavir, ritonavir, lopinavir, saquinavir;
  - contre la tuberculose : rifampicine, rifabutine, rifapentine;
  - contre les crises ou les convulsions : phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine;
  - millepertuis;
- vous consommez du pamplemousse, des boissons ou des produits qui contiennent du pamplemousse.

**Afin d'éviter les effets secondaires et de vous assurer d'une utilisation adéquate, consultez votre professionnel de la santé avant de prendre CORZYNA<sup>MC</sup>. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :**

- tous les médicaments que vous prenez (sur ordonnance, en vente libre et produits de santé naturels);
- si vous souffrez, ou avez des antécédents familiaux, d'un problème cardiaque appelé « allongement de l'intervalle QT » ou « syndrome de QT long »;
- si vous présentez de faibles taux d'électrolytes (comme un faible taux de potassium, de magnésium ou de calcium), une affection qui peut causer un faible taux d'électrolytes (comme des vomissements persistants et des troubles alimentaires) ou si vous prenez des médicaments qui peuvent affecter les taux d'électrolytes, tels que des diurétiques, des laxatifs, des lavements, des doses élevées de corticostéroïdes, et des médicaments pour le reflux acide ou le reflux gastro-œsophagien (RGO);
- si vous avez des problèmes hépatiques;
- si vous avez des problèmes rénaux;

- Si vous présentez des **problèmes hépatiques modérés ou graves**, ne prenez pas CORZYNA<sup>MC</sup>.
- Vous ne devez pas prendre CORZYNA<sup>MC</sup> si vous êtes **enceinte ou si vous allaitez**.

**Prévenez votre médecin si vous avez déjà eu un électrocardiogramme (ECG) anormal, des étourdissements ou des nausées, si vous vous êtes senti(e) malade ou avez ressenti des effets secondaires inattendus après avoir commencé à prendre CORZYNA<sup>MC</sup>.**

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit en :

- visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur la façon de faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur;
- composant sans frais le 1-866-234-2345.

REMARQUE : Communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

#### Pour en savoir davantage au sujet de CORZYNA<sup>MC</sup> :

- communiquez avec votre professionnel de la santé;
- lisez la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur les médicaments pour les patients. Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada (<https://health-products.canada.ca/dpd-bdpp/switchlocale.do?lang=fr&url=t.search.recherche>); le site Web du fabricant [www.kyepharma.com](http://www.kyepharma.com), ou peut être obtenu en téléphonant au 1 888 822-7126.

- si vous êtes enceinte ou prévoyez de tomber enceinte. Les effets de CORZYNA<sup>MC</sup> sur votre bébé à naître sont encore inconnus;
- si vous allaitez ou prévoyez allaiter. Les possibilités d'excrétion de CORZYNA<sup>MC</sup> dans votre lait maternel sont encore inconnues. Votre médecin décidera si vous pouvez allaiter ou si vous devriez arrêter le traitement par CORZYNA<sup>MC</sup>.

#### Autres mises en garde à connaître :

**Patients âgés de plus de 75 ans** : Vous pourriez être plus susceptibles de présenter des effets secondaires.

**Surveillance et examens de laboratoire** : Avant de commencer le traitement par CORZYNA<sup>MC</sup> et périodiquement pendant le traitement, votre médecin doit :

- effectuer un électrocardiogramme (ECG) pour surveiller l'activité de votre cœur;
- effectuer des analyses de sang pour vérifier vos taux d'électrolytes;
- vérifier vos fonctions rénales et hépatiques.

**Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine alternative.**

Les médicaments suivants peuvent aussi interagir avec CORZYNA<sup>MC</sup> :

- médicaments pour les problèmes cardiaques, y compris les arythmies : p. ex., digoxine, propafénone, flécaïnide;
- médicaments contre les infections bactériennes, virales ou fongiques : p. ex., érythromycine, rifampicine, rifabutine, rifapentine, fluconazole;
- médicaments qui préviennent le rejet d'organe après une greffe : p. ex., cyclosporine, sirolimus, everolimus;
- médicaments pour réduire le taux de cholestérol : p. ex., simvastatine, lovastatine, atorvastatine;
- médicaments contre l'hypertension : p. ex., métoprolol, diltiazem, vérapamil;
- médicaments contre la dépression : p. ex., imipramine, doxépine, amitriptyline;
- metformine – utilisée pour traiter le taux de sucre élevé (diabète);
- tacrolimus – utilisé pour traiter l'eczéma.

#### COMMENT PRENDRE CORZYNA<sup>MC</sup>

Prenez CORZYNA<sup>MC</sup> :

- exactement comme votre médecin vous l'a expliqué.
- **Ne pas** écraser, casser, ni mâcher les comprimés. Avaler les comprimés en entier.
- **Ne pas** prendre plus 1 000 mg deux fois par jour.

**Dose habituelle pour les adultes** : 500 mg ou 1 000 mg deux fois par jour.

**Dose oubliée** : Si vous oubliez de prendre une dose, attendez et prenez votre prochaine dose à l'heure prévue. Ne doublez pas votre dose pour compenser la dose manquée.